
DISSERTATIO MEDICA,

INAUGURALIS,

DE

I C T E R O.

Dr. Young

Worth & Compt. of 2

Author

DISSERTATIO MEDICA
INAUGURALIS,

DE

I C T E R O.

QUAM

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,

D. GULIELMI ROBERTSON, S.S.T.P.

ACADEMIÆ EDINBURGENÆ Praefecti;

NEC NON

Amplissimi SENATUS ACADEMICI consensu,

Et nobilissimae FACULTATIS MEDICÆ decreto;

PRO GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

Eruditorum examini subijcit

GEORGIUS MAXWELL,

HIBERNUS.

Soc. Reg. Med. Edin. Soc. Ext.

Nec non

Soc. Reg. Phys. Edin. Soc. Hon.

Ad diem 24. Junii, hora locoque solitis.

EDINBURGI:

Apud BALFOUR, et SMELLIE,

Academiae Typographos.

M,DCC,LXXXIX.



Fratri suo,

Et amico, et dilecto,

ROBERTO MAXWELL,

Jurisconsulto

Dubliniensi;

Amoris fraterni

Testimonium,

Hocce Tentamen

Offert

A U C T O R.

DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS,

DE

ICTERO.

MORBUS, de quo pauca dicere institui, materiem investigationis amplissimam sine dubio praebet; sed in themate hujusce generis, tempus omnes minutias tam accurate exquirere, quam natura rei admittere queat, permitturum, haud expectandum erit. Igitur generales sententias, atque praesertim recentium
A celeberrimi

celeberrimorum physiologicorum, quibus exponendo veram morbi naturam causamque maxime sumus devincti, colligere sufficiat.

Icterus hodie saepius appellatus, diversis aliis appellationibus antiquis cognitus fuit; praesertim ex specie quae in corpore humano adsumpsit, morbus Regius, morbus Arquatus, Aurigo, &c. nominatus *.

Hic morbus qui ex jecore et appendentibus originem ducit, effectibus ubique in corporis superficiem, quodam flavo colore cernendis, fere dignoscitur: Qua ex re, in circuitu fluidos bili praeter naturam oneratos esse, plane monstrantes:

* Derivatur haec denominatio vel ab *ικτις*, *viverra*, cujus oculi tale colore tincti cernuntur; vel ab Ictero, avenempe illa, quae Germ. *Geld-Hammerche* vocatur; dicitur etiam aurigo ab auri colore; item morbus Regius.

JUNCK.

tes *: Causa cujus revera olim haud recte fuit perspecta, clare elucidando palma, ut opinor, iis qui systema lymphaticum et absorbens detegerent, debitum est.

Jecur cujus situs dextro in hypochondrio factis cognoscitur, viscus destinatum ad noxias partes sanguinis secernendos; atque bilem ita secretam, nihil aliud esse nisi excrementitium et noxium ex corpore intestinis exonerandum, olim ratum fuit. Autem, quamvis ex vasta successione

* Flavedo cutis oriri potest, vel a bile non, ut solet excreta, sed in vasa sanguifera excepta, et inde subter cuticulam effusa; vel a sero sanguinis saepe flavescente, subter cuticulam, ut in ecchimosi, effuso. In quibusdam casibus, an flavedo cutis ab una vel altera illarum causarum oriatur, apud medicos non semper constat; sed tantum ex prima Icterus genuinum, et ab altera morbum diversum, quique, quantum fieri possit, distingui debet, oriri censemus.

Syn. Nesf. Meth. Cullenii, pag. 299.

cessione malorum quae interruptum et retentum corpore superveniunt, verisimilis haec opinio videretur; tamen hanc secretionem usus necessarios et utiles oeconomiae praebere, hodie bene notum est; hinc mirum et valde rarum ad secretionem confilium. Sanguis, ex quo maxime derivanda cernitur, ex chylopoieticis plerisque abdominalium viscerum fertur, inde per venam portarum ad jecur missus; hoc, arterii munere fungentem, modus circulationis nusquam alibi corporis cernendus *.

Bilis ita generata, variis ex morbidis causis varios morbos producit effectus; atque inter alios *Icterus*, quem noster illustrissimus Professor Cullenus

* Hinc, Physiologistis hunc rarum sanguinis cursum, solum propter secretionis causam esse, ratum fuit. Tamen pori biliarii atque ramuli venae cavae hepaticae, venae portarum et arteriae hepaticae, inter se inosculant, ut iniectione probare impossibile est.

Cullenus inter Impetigines tertio ordine, tertiae classis *Cachexia* enumeravit †; atque sic descripsit:

“ Flavedo cutis et oculorum; faeces albae;
“ urina obscure rubra, immixta colore luteo
“ tingens.”

HISTORIA MORBI.

Morbi haud raro magna varietate, etiamque diversitate symptomatum sese ostendunt; et auctoribus saepe seducti sumus, qui theoria loco veri innixi, morbos majore accuratione et ordine, quam fere appareant, describunt.

Descriptio

† Vid. Syn. Nosol. Method.

Descriptio symptomatum semper sibi constans, et in uniformi successu in hoc morbo aegre esset aggressa; diversis ex auctoribus ea enumerare, atque in unum conspectum colligere, mihi sat erit.

Dum aeger de lassitudine, inertia, cum oppressione dextro in hypochondrio queratur; in oculorum tunicis, unguium radicibus, et in scrobiculo cordis, flavus color visibilis incipit; qui modo augescens, per totam corporis superficiem plane visu fiet; tensio et anxietas, haud raro cum dolore epigastrica regione, praesertim aucto post repletionem, sentiuntur; appetitus plerumque attenuatus; alvus fere nimis adstricta; excrementa, non magno cum foetore, cinerea; urina turbida sedimentum copiosum deponens; gustus amarus in ore sentitur *; calor mordax

nares

* Solida praecipue. Vid. Heberden. Med. Transf.

nares angit; prurigo omnem superficiem vexat *; cutisque arida, tactui aspera; febrilia symptomata, nausea, et vomitus, saepe singultus, occurrunt; somnolentia interdum et parum somno recreatus; atque multa alia pro re nata, locum obtinent.

Quidam auctores † flavam visionem haud infrequens symptoma esse volunt; dum alii ‡, quibus tale nunquam se obtulit, non solum dubitant, sed posse esse denegant. Quoniam tantum
de

* Tum solum evanescente morbo. STARK.

† Hoffman cum aliis.

“Lurida praeterea sunt quaecunque tuentur arquati.”

LUCRETIVS.

‡ Heberden, qui insuper addit; lac Ictericarum non tinctum esse. Sed observavit expertus Home fluorem album, etiamque pus ulcerum nonnunquam tinctum, licet oculi humores evadunt,

de hac re sit certamen, nimis arrogantiae foret me litem componere. Licet mihi tamen recordari, in Regio Nosocomio, sub curatione praestantissimi Medici Doctoris Gregorii, me semel aegrum vidisse, qui rogatus an objecta ei flava apparerint; respondit maxime. Contra, bene fit notum, quod in pessimis hujusce morbi casibus, quum saliva omnesque fere alii humores tincti fuerunt, nullum tamen tale obtinuit. Si semel probatum foret, quod humores oculi unquam tincti percipiebantur, tunc auctoribus qui aiunt fere occurrendum esse, fides daretur *.

Quibusdam in casibus, inveterascente morbo, alia, magisque gravia symptomata, praeter haec jam enumerata occurrunt. Ardens interdum febris,

* Experimentis illustrissimi Monro apparet,

Rubiam tinc. animalibus datam, tincturam nec corneae, nec oculi humoribus non impertire; dum omnes alias corporis partes, miro modo, pervadit.

bris, etiam delirio insequitur; angens capitis dolor atque spirandi difficultas; magna praecordiorum oppressio; flatibus intestinorum; dolorque excrucians et tensio dextro in hypochondrio, nonnunquam ad humerum dorsumque tendens; interdum corpus incurvatum aegrum servare inducens; hinc nomen arquatus. Flavedo cutis magis augefcit, icterum auctorum nigrum producens; sudor lintea flavo colore tingens, tetrum corpus exhalat odorem; diarrhoea putrida; hydropes; hemorrhagiae, ex ore, naribus, intestinis, &c. omneque debilitatis symptoma superveniunt; atque interdum hectica malis vitae aegrum morte eximit.—Hic morbus ullum haud fixum cursum servat, sed majore vel minore cum progressu; paucis vel pluribus symptomatibus; comitantibus, prout causae excitantes, progreditur. Saepius mitescit, iterumque magna vi redibit, atque bili in intestinis observata symptomatum allevatio mox insequitur.

Dissecando, bilem fere unicuique corporis parti, cellulofas, adipofas, et membranas internas fitas, aequè ac cutim invadere, et colorem suum impertire discimus; cerebrum atque ejus meninges, cartilagine, atque ossa; quae quidem post morbum amotum tincturam quosdam annos retinere, fuissent observata; etiamque foetus in utero Ictericæ haud eximitur, ossa cujus plane tincta, visa essent *.

D I A G N O S I S.

Quoniam diagnosis methodum medendi dirigere utilis; itaque maxima cura omni tempore, ad morbos accurate distinguendos, adhibenda debet. Morbi tam saepe commixti atque innixi symptomatibus anomalibus, ut ex specie

* Vid. Bonet. Sepulch. Sect. xviii. Obs. 34.

specie sola decernere fallax esset ; et ad erroneum, forsan fatalem, medendi modum nos induceret. Verum hoc apparebit, quod unum idemque symptoma ex directe diversis causis haud raro occurrit, atque modum medendi diversum postulans. Itaque causis tam accurate exquirere debemus, quam cognosci possint.

Icterus tamen, ut ex historia jam recensita, ab aliis morbis facile dignoscitur, non colore tantum, (etsi sit morbi index maxime perspicuus), nec tamen statu alvi, nec faecum, nam haec varia, variis in casibus ; sed ex quodam statu urinae ; atque symptomatum progressum attente observando, qualia sint sensus atque dolores circa jecoris regionem, atque hi plerumque colorem oculi, &c. praecedentes.

In hac dissertatione aliquid de symptomatico ictero dicere vix necesse erit ; qui in quibusdam

dam febribus locum tenet, praesertim Occidentalis Indiae, quaeque tantum causa ex idiopathicis differunt; illas sine obstructione, sed e contra, ex quantitate bilis in intestinis * aucta, oriuntur; quod raro in his evenit.

Ex flavedine, quae nonnunquam in puellis chlorosi adfectis apparet, discrimen facile invenimus; sed quae ex causa valde diversa producitur, bile non conducente, nec flavedo primum in tunica oculorum sclerotica, atque inde sensim ubique augescens, percipitur; nec affectio hypochondrii sentitur, vel tinctoria urina omnino cernitur; tametsi de anxietate epigastrica regione nonnunquam queruntur, tamen diagnosis satis alia monstrant.

C A U S A E

* Vide Sir John Pringle.

CAUSÆ REMOTÆ.

1mo, *Praedisponentes*.—Hic morbus omnem aetatem, sexum, et crasın invadit; sed adulti et aetati provectiores, quique segnem vitam agunt*, gravioraeque foeminae sunt magis ei obnoxii. Regiones calidae et tempora, admire augendam et secernendam bilem rata sint; qua de causa in calidis regionibus multo frequentius morbus esse dicitur; frequens et immoderatus liquorum spirituosorum usus, jecur praecipue laedendo, ad hunc malum praedisponere putetur; itemque hemorrhoidalis et menstrui fluxus suppressio; atque post febres occurrere dicitur.

Hysterici,

* Hallerus scripsit, calculos felleos saepe se occurrisse convictis, qui in custodia diu tenerentur.

Hysterici, biliosi, quique violenti agitatione expositi, sive ex animi affectibus, seu quovis violenti motu corporis, vel quibusdam irritationibus adhibitis, qualia sunt, draastica cathartica, et emetica, huic morbo sunt maxime opportuni. Omnia haec magis directas vel occasionales causas excitare tendentia.

2do, Occasionales.—Transitum bilis quidvis interrumpens, et liberam excretionem in duodenum impediens, causa frequentissima icteri haberi potest. Mortua dissecando, talis obstructionis origines variae sese ostenderunt; qualis concretiones biliariis ductibus inhaerentes; tumores jecoris et viscerum vicinorum, ita siti ut ductus comprimunt. Morbi, observatio auctorum consentiens calculosas concretiones talis obstructionis frequentissimas esse causas perluce probat.

Calculi

Calculi hi raro in hepate ipso inveniuntur, autem saepius in vesica fellea, et quamdiu illic, vel in ductu cystico remanent, raro, si unquam morbum exciunt, nisi caeteros ductus quoque comprimant; hoc videtur verum, quia saepe-numero iis locis, haud comitante hoc morbo, detecti fuerunt. Quamdiu bilis transitus ex hepate ad duodenum liber remansit, nec in hepate, nec in vesica fellea, quae sola receptaculum redundantis bilis, ulla erit accumulatio. Bilis in vesica fellea stagnat, et inspissata invenitur, atque ex massis grumosis, calculosae concretiones formari videntur; sed de hoc paululum adhuc cognitum est *. Variarum formarum, coloris,

* Van Swieten narratur nobis, quod bilis immota massas concretas formabit. Sed M'Lurg nunquam ita invenit, nec tale in aliqua bile videbam, quam aliquamdiu servaveram. Cito cum acidis coagulare invenitur; atque M'Lurg opinatur, aliquod de acido ventriculi in
contacto

loris, et crassaminis, levitate ab aliis corporis calculis, atque oleosa et inflammabili natura, distinctae sunt *.

Ex variis agitationibus, &c. (ut supra memoravi) hae concretiones ex vesica fellea ejici, et per ductum cysticum cogi possint, qui ductu communi minor raro detinentur donec ad ingressum posterioris in duodenum deveniunt, ubi ex obliquitate facilius, etiam quavis in spissata massa obstrui possint. Atque quotidiana experientia has causas frequenter obtinere edocit; nam massae grumosae, aequae ac concretiones

contacto cum eo in ductibus venire; sed vix possumus existimare eam transire usquam ad vesicam felleam. For-
san acidum corporis saccharinum quemvis effectum haberet; nam, quantitatem acidi sacchari parvam addendo, praecipitatum spissum ad imum confidere observavi.

* Vide Morgagni.

cretiones calculosae allevatione symptomatum ictericis exoneratae fuerunt.

Hydatides in abdominalibus visceribus, praesertim in jecore, haud raro formati, icterique causa evadunt *, hydatides hi in ductum hepaticum viam pandunt, et ad intestina acti sunt †; autem in transitu obstructionis saepe fiunt causa.

Glandularum distentio intus capsula Glysonis, et tumores ipsius jecoris, inter causas excitantes

C

tes

* Vide Stark, part 1. ch. 1. § 10.

† Professor Monro ostendit hydatides mirae magnitudinis, qui cum faecibus evacuati erant, et dissecando corpus, biliariis ductibus distensis, ex hepate progressos esse reperiebat. Forte fortuna aegram violenter ictero affectam videbam, quae longo tempore, quotidie excrementis evacuavit, multos parvos hydatides fluidum flavum continentes, allevatione symptomatum.

tes enumerati fuissent. Autem hos non tam saepe conducere, quam ratum fuit, ex dissectionibus diversis apparet; granulis, tuberculisque saepe jecore, ubi nullum symptoma ictericum praecedisset, repertis. Praeterea, ex ingeniosis argumentis illustrissimi Doctoris Monro *, talis saltem causae frequentiam, a priori, rejicere inducimur; nam tumores ejusmodi venae portarum aliorumque sanguiferorum ramulos comprimunt, priusquam ductuum biliarium obstruant, qui passim contigui, atque quodam modo grandium sanguiferorum ramulis tecti sunt; hinc verisimile est, quod secretionem iusta ratione impediri oportet, priusquam excretio supprimi potest; atque, icterum ex obstructione hepatis, iustam bilis secretionem impediendo, oriri posse, lucide atque sine dubio, multis exemplis evertitur; nam, ictero haud producto, hepar scirrhus, abscessuque omnino morbosum

* Vide Monro's works.

bosum invenitur. Tamen quomodo tumores praesertim concavae jecoris superficiei eodem modo quo viscerum vicinorum ita siti, ut ductus majores comprimant, facile discernitur.

Tunicae ductuum ipsorum morbosae, atque cavitas eorum oblitterata reperta fuit. Duodenum ita distensum vel irritatum, ut ductum contractare vel obstruere possit; vel parva, qualia sunt fructuum semina, in orificium ejus acta sint.

Spasmus ductuum, alias inter causas, locum principem tenere censetur. Sed quidam, haud observando muscularem tunicam, vel in vesica fellea, vel ductibus, hoc negaverint: Etiamque ex iis viventium animalium partibus, [sine ulla sensibili contractione irritatis apparente *; tametsi

* Experimentis Doctoris Monro in Academia recensitis,

metfi hoc non omnino rem sine dubio ponat ; quoniam aliae partes, ubi fibrae nullae musculares indagari possint, contractilitate sunt praeditae, tamen ex his talem spasmodicam contractionem non late locum habere opinamur ; autem, ubi ductus in intestinum ingreditur, verisimile occurret. Hystericis in morbis interdum haec evenire potest, et ex irritantibus ad contractionem intestinum stimulantibus ; atque hoc modo ductus orificium qui inter tunicas ejus oblique transit, obstrui potest ; et omnia phaenomena, spasmu ipsorum ductuum attributa, producant.

Paroxysmos recurrentes, allevationemque opio adhibendo, suppositione spasmu explicandum esse, ratum fuit ; Sed paroxysmi recurrentes, calculis, atque etiam eodem calculo, induci possint *,

(*Monro*)

* Hic illustrissimus Professor, icteri recurrentis iteratis paroxysmis

(*Monro*) et opium multis in casibus dolorem allevando, fit utile; atque aliter quam ex virtutibus antispasmodicis explicari potest. Quinetiam calculi impacti in cystico ductu dolorem angentem excitantes reperti fuerunt, ictero haud comitanti; irritationem in hoc casu, spasmus vicinorum ductuum, post inde icterum induxisse putaretur. Sed multa repugnant, neque Morgagni* observationes fatis confirmaverunt.

Morbus

paroxysmis 4 annis casum memorat. Æger faeces per vannum semper evacuavit, sed nullae concretiones unquam cernebantur. Dissecando, calculus talis formae, qualis in uno situ inveniebatur, ut orificium ductus omnino obstruxisset; altero bilem transire sineret.

* Enumeravit casus icteri producti perturbatione animi; itemque dissectionem quorundam, qui subito mortui erant, nullo obstruente viso, inde assertur spasmus esse.

Morbus (interveniente spafmo) ab morfu viperino ortum duxiffe, olim ratum fuit ; fed flavedinem hic productam, non de bili, autem ex quadam actione veneni animalis in fanguinis ferum oriri, nunc bene fcitum eft ; ut ex colore a vulnere dato incipiente, non ubique apparente, nec fefe fecretionibus oftendente, apparet.

Ex quo in diagnosi de ictero fymptomatico, memoratur, vix neceffe erit addere, fecretionem bilis aucta morbum interdum oriri poffe *. Hic fluidus infolita quantitate in intestinis fufus, lactea ad recipienda, et in fystema ducenda, ftimulare poteft ; quodque res ita fe habet, biliofum vomitum et purgationem tales cafus comitantes obfervando, cernitur. Hic interdum fit cafus, in ea flavedine, quae in infantibus poft natum obtinet ;

* Ictero fymptomate, in febribus ubi faeces alvinae bilis fecretionem non obftructam demonftrant.—*Home Prin. Med.*

obtinet * ; licet absorptione meconei saepius nitratum sit, atque veri icteri naturam non sibi trahit †.

C A U S A P R O X I M A.

Ex conspectu de casibus remotis jam dato, ad icterum producendum apparet, bilem in corpore detineri, atque etiam necessario, in massam circumeuntem admitti oportet ; autem modus admissiois adhuc in dubio est.

Duae opiniones medicorum attentionem nuper traxerunt : Nam, ut supra dictum est, idea olim accepta ; nempe, bilem in sanguinis massa prius extitisse, atque solum ab hepate separatam
vel

* Icterus (infantum) in infantibus haud diu post natales oriens.—*Cullen. Syn. Nos.*

† Vide Med. Ess. vol. 1. Edin.

vel coarctam esse; itaque ullam interruptionem vel praeventionem hujusce separationis, redundantiam morbum producentem praebere, nunc fere univérse ab omnibus conceditur; nam nunquam probatum fuit, ullum fluidum naturae bilis in corpore extitisse cum viscus fecernens officio fungendi incapax factum fuisset; et varia exempla jecoris omnino morboſi reperti, et omnis ſecretionis obſtructae, ictero non producto, talem hypotheſin ſatis diruunt.

Itaque una opinio quae univérſe accepta fuit, atque adhuc mente quorundam medicorum obtinet, bilem progreſſu ad inteſtina obſtructam, in canalibus regurgitare oportet, et in ramulos venae cavae hepaticae cogi, vel adſumpſi, et ita in ſanguinis maſſam duci; atque haec doctrina ſine aemula in Academiis Medicinae, donec poſt ſyſtematis lymphatici detectio momentofa, locum tenuerat.

Sed

Sed quum usus eorum melius intelligerentur, alia idea se obtulit, viz. quoniam lymphaticorum usus absorbere fit, et quod jecur vesicaque fellea cum iis affluere, reperta sunt, bilem ab iis esse absorptam verisimile apparuit, atque hoc modo in systema sanguiferum ductam esse.

Haec absorptionis doctrina, non solum argumentis, sed etiam experimentis factis, illo praeclarissimo Physiologista *Monro* potenter patrocinata fuit.

Argumentatio, (ex usibus lymphaticorum vasorum, quasi distincti systematis cognitis; quodque absorptionis officium in omnibus corporis partibus, per ea, et non per venas rubras, promovetur, nunc satis intelligitur; praeterea improbabilitas cujusvis in naturalis atque retrogradi motus occurrentis) huic opinioni clare favet.

Autem prior hypothesis in basin experimenti confirmasse rata fuit; enim injecta in ductum hepaticum viam in cavam pandisse inveniebantur; atque hoc bilis cursus fatis plane putaretur. Sed injecta in venam portarum facilius intrabunt; atque *Dæctor Monro*, quod in talibus experimentis vasorum rupturam fieri, clare monstravit; nam quod ora aperta vasorum inhalentium injeci non possint, fatis cognitum est.

Praeterea, in casibus quam plurimis, ubi permanens icterus productus fuit, ductum communem cholidochum astringendo, ductus porique biliarii valde distensi auctique inveniebantur, tamen communicatio minime magis aperta cernibatur, nec injectio minore vi transivit; atque animali vivente bilis in sanguifera jecoris, pressura non cogi posset, vesica fellea vel ductus vi distendenti primum sese dederunt.

Adde

Adde insuper experimentum aliud, ab illo accuratissimo anatomico factum, quod mihi conclusum, et rem sine dubio ponere videtur: In diversis animalibus ligatura in ductum communem stricta ictero inducto; postea dissecando, bilem in lymphaticis, etiamque thoracico ductu, in magna copia, et colore et gustu distinguibilem indagare potuit. Quum itaque bilem esse lymphaticis assumptam, atque hoc modo ad systema sanguiferum missam, certe probatum est: Cur itaque dubitemus hunc morbum absorptione sola esse productam?

Quaedam praecipua argumenta ad stabilendam hanc hypothesin memoratus, minoris momenti recensere, vel varia argumenta fautoribus harum opinionum adducta enumerare, certe inutile esset; pleraque quorum nugatoria, nulla eorum animum explent.

Nunc

Nunc igitur morbum breviter considerare, atque quo modo causae jam enumeratae, cum symptomatibus productis consentiunt, discernere procedendum est: Ex quo supra dictum fuit, praesentiam morbidam vero ictero propriam de quantitate bilis in sanguinis circumeuntis; cum sero ad secretiones progredientis atque in vasa cutanea porosque sese diffundentis, ex acri et stimulantia natura pruriginem efficientis, niti apparet. Flavedo ex candore et pelluciditate tunicae conjunctivae primum in oculo cernenda,

Quibusdam in casibus, praesertim in ictero auctorum nigro, extravasatio tincti feri locum tenebit, atque ex fibrarum simplicium laxitate et debilitate fiet.

In canali alimentario defectus hujus necessarii solitique stimuli, constipationem speciemque faecum, quae vulgo occurrunt, explicat; atque subitus

bitus descensus bilis, diarrhoeae, fuscae anſam praebebit, quae ſaepe progreſſu morbi, atque fere cum allevatione, obſervatur.

Ventriculi vicinitas univerſaque ſympathia, inappetentiam, naſeam, et caetera explicant.

In hepate quaevis obſtructio reſiſtentiam ſanguini in vena portarum atque vaſis cum iis conjunctis dabit, ita ut repletio eveniet; hinc oppreſſio, tenſio, laſſitudo, ſomnolentia, ſpirandi difficultas, et haemorrhagiae explicari poſſint *.

Dolorque in dextro hypochondrio et epigaſtrio vel ex diſtentione cyſti vel ex calculis in ductibus

* Dans tous les embarras du foie, les veines capillaires inteſtinales ſe laiſſent tellement engorger de ſang, qu’elles deviennent variqueuſes, et ſe rompent a’ la fin: c’eſt la cauſe ordinaire des diſſenteries qui arrivent dans le cas des abſcés au foie.—*Pathologie de Monſ. Hevin.*

tibus constipatis oriri potest. In priore casu dolor obtusus ; posteriore magis acutus subitusque erit, diverse tendens, interdum febris arden-
ti crebrisque intermissionibus ; subitus paroxif-
mus descensum calculi ex cysto notat, atque
distentio dolorque magnitudini calculi conve-
niunt ; ductibus magis relaxatis, curvato cor-
pore, aeger levamen quaerit, pleraque alia symp-
tomata, talia vigilia, ardor auctus, sitis, &c. de
irritatione et inflammatione producta nitentur.

PROGNOSIS.

Et si hic morbus plerumque periculosus non
estimetur, tamen prognosis semper est incerta.
Observare vix necesse est, (caeteris paribus) ado-
lescentibus eisque sanis et vegetis magis suspicata
erit ; periculumque ex violentia atque dura-
tione

tione caufarum praecipue vereatur; conjecturae igitur ex his caufis cognitae inducendae funt; fi calculi exiftere rati funt, expulfionem fperare poffumus, autem haud fine timore talem caufam renovari; diarrhoea biliofa occurrens eft fymptoma felix, obftruentis amotum denotans. Si ex acceffione morbi gradatim aliisque locus fit nobis fchirrofus tumores viscerum, feu, ductus morbofos oblitteratos, fufpicandi; vel fi hydropes, haemorrhagiae, diarrhoea colliquativa, vel fudores, &c. fuperveniunt, fpes noftra nimis alacris diagnofin benignam praebere non poteft.

R A T I O M E D E N D I.

Ex natura hujus morbi, ab caufarum varietate pendentis, plerumque parum cum generali fyftemate,

systemate, vel inter se conjunctarum, unam eandemque medendi rationem non semper servari, lucide apparet; curandi modus igitur, ex scientia excitantium et occasionalium causarum accurata, adhiberi debet: quae causae genere differentes, diversum tractandi modum de re exigent.

Duae tamen generales indicationes proponi possint, quarum esset,

1mo, Occasionales et excitantes causas amovere;

2do, Magis urgentia symptomata allevare; autem haec posterior primum saepe arte egebit. De priori observetur, quoniam hic morbus quadam ex obstructione excretionis bilis maxime oriri invenitur, attentionem praecipuam adhiberi oportet, ut causam obstruentem certe inveniamus;

inveniamus ; videtur atque, ex observatione et experientia, calculosas concreciones in ductibus infarctas frequentius operam dare, et praecipue suspicandas. Expulsio earum igitur promovenda sit, vel;

1mo, Mechanice, usu emeticorum, cathartico-
rum, exercitationisque bene moderato ; vel;

2do, Chymice, usu solventium interne adhibendo.

Ratio prima praecipue consideranda atque confidenda. Ad hanc rem, agitatio corpori actione emeticorum impertita, multum laudata fuit, quasi calculus antrorsum in duodenum cogens ; autem sine dubio hoc modo saepe utilia fient ; forsan quoque corpore necessarie ductibus relaxatis, post actionem, calculi descensui favent ; tamen caute utenda, atque so-

lum repetenda, prout utilia vel necessaria videantur; nam, si nimis pertinaciter adhibita, quae amovere data, arctius stipare possint.

Draastica cathartica fuerunt etiam commendata, quod intestina et ductus stimulando expulsionem ambiunt, atque excretionem obstruentis promovent; sed mitiora plerumque sufficient, etiamque haec frequentius non repetenda, propter debilitantes effectus.

Remedium est exercitatio, cautione minore admittenda, atque non minore beneficio. Sanguinis missio, prout aegri vires admittere queant, fomentationes, injectiones emollientes, atque regimen refrigerans, erunt commoda, quod ductus relaxare conducunt, et calculi descensui favent, praesertim si dolor tensioque adsint: Hoc autem secundae rationis partem producit, dum auxilio primae fit.

De

De secundo modo proposito, liberare ab his calculis, multa medicamenta quasi solventia laudantur; talia sunt, saponés, alkalina, aqua calcis, aër fixus, succus graminis, &c. *. Atque multa ab auctoribus fautoribusque horum fuerunt dicta. Sed experientia candida, haec omnia aequè sine effectu inveniri edocuit, nisi *quomodo* purgativa sint. Atque equidem difficile est rerum quomodo medicamenta, post circuitum transissent, ad ductus biliarios pervenire, atque ita agere in calculos, ut dissolvere possent, eodem modo, quo ex corpore perficere rata fuerunt.

* Mons. Durande, Médecin de Dijon, a éprouvé qu'un mélange d'éther et d'huile essentielle de térébinthine rectifiée pris tous les jours a la dose d'un gros, par dessus on fait boire quelque petit lait, procurent souvent la dissolution et la sortie des pierres biliaires. C'est un véritable savon dont nous avons vu des expériences heureuses.

HEVIN.

runt. Jecoris et viscerum vicinorum tumores, qui interdum causa obstructionis sunt, ex propriis generibus tractandi; si generis inflammatorii febrem, &c. excitantes, sanguinis missione et regimine antiphlogistico sunt tentandi: Autem, si lenta accessione et duratione, suspicari scirrhus, vel ductus obliteratos causam habeamus, et si parum expectetur tamen horum medicamentorum periculum fiat; mercurialium, cicutae, minerales praecipue chalybiae aquae, quae similibus in casibus laudata fuerunt.—Si quantitas bilis aucta in intestinis causa fuisset, conandum est quam maxime secretionem tardare, determinationem ad alias corporis partes, nempe superficiem, renesque promovendo, atque hoc minimis stimulantibus. Emetica exercitatioque sunt fugienda; atque purgativa lenissima tantum admittenda. Infantibus levis evacuatio semel vel bis adhibita, manna, magnesia, vel similibus, fere effectum producent.

2dae indicationi partim obviam itur, distentionem sublevando et dolorem, atque symptomata febrilia sanguinis missione si necessaria repetita: Fomentationibus ad regionem hepatis, opiatis, &c. Arida prurigo cutis sudorificis allevatur; autem mitissima tantum adhiberi debent, talia sint balnea tepida, &c. Symptomata ex bilis inopia in intestinis producta, viz. alvus astricta, indigestio, &c. amaris et lenibus laxativis allevari debent: Sapo aloëque commixta, quia quomodo naturae bilis conveniunt, multum laudata fuerunt; atque non tantum quasi amarum et purgativum, sed etiam quasi menstruum ad commiscendum oleaginosas atque aquosas alimenti partes efficient, atque ita chyli-factum promovent.

Omnia diversa medicamenta, quae huic morbo utilia commendata fuerunt, enumerare haud necessarium opinor; pleraque quorum Empiri-

cis originem duxerunt, atque attentionem non merentur. Quum primum morbus amoveatur, vires aptis tonicis sunt restituendi; praedisponentes causas fugiendo, reditus praecavendus est.

F I N I S.